

NCERT SOLUTIONS

CLASS - 10th




aglasem.com

Class : 10th
Subject : Mathematics
Chapter : 2
Chapter name : बहुपद

Exercise 3.1

Q1 किसी बहुपद $p(x)$ के लिए , $y=p(x)$ का ग्राफ के नीचे आकृति 2.10 में दिया है । प्रत्येक स्थिति में $p(x)$ के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए ।



Answer.

- (i) ग्राफ x - अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है अतः शून्यकों की संख्या 0 है ।
- (ii) ग्राफ x - अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है अतः शून्यकों की संख्या 1 है ।
- (iii) ग्राफ x - अक्ष को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है अतः शून्यकों की संख्या 3 है ।
- (iv) ग्राफ x - अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है अतः शून्यकों की संख्या 2 है ।
- (v) ग्राफ x - अक्ष को चार बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है अतः शून्यकों की संख्या 4 है ।
- (vi) ग्राफ x - अक्ष को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है अतः शून्यकों की संख्या 3 है ।

Page : 31 , Block Name : प्रश्नावली 2.1

Q1 निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए ।

(i) $x^2 - 2x - 8$

Answer. $x^2 - 4x + 2x - 8$

$= x(x-4) + 2(x-4)$

$= (x+2)(x-4)$

समीकरण $x^2 - 2x - 8$ का मान शून्य है , $x+2=0$ या $x-4=0$, अर्थात् $x=-2$ और $x=4$ हो ।

इसलिए $x^2 - 2x - 8$ के शून्यक -2 और 4 है ।

अब शून्यकों का योग $= -2+4=2 = -(-2) = 2 = \frac{x}{x^2}$ का गुणांक

शून्यकों का गुणनफल $= -2 \times 4 = -8 = \frac{-8}{1} = \frac{\text{अचरपद}}{x^2}$ का गुणांक

Page : 36 , Block Name : प्रश्नावली 2.2

(ii) $4s^2 - 4s + 1$

Answer. $4s^2 - 2s - 2s + 1$

$= 2s(2s-1) - 1(2s-1)$

$= (2s-1)(2s-1)$

समीकरण $4s^2 - 4s + 1$ का मान शून्य है, $2s-1=0$ अर्थात् $s = \frac{1}{2}$ हो।अतः $4s^2 - 4s + 1$ के शून्यक $\frac{1}{2}$ और $\frac{1}{2}$ है।

अब शून्यकों का योग $= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 = \frac{-4}{4} = \frac{-s}{s^2}$ का गुणांक

शून्यकों का गुणनफल $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = \frac{\text{अचरपद}}{s^2}$ का गुणांक

Page : 36 , Block Name : प्रश्नावली 2.2

(iii) $6x^2 - 3 - 7x$

Answer. $6x^2 - 7x - 3$

$= 6x^2 - 9x + 2x - 3$

$= 3x(2x-3) + 1(2x-3)$

$= (2x-3)(3x+1)$

समीकरण $6x^2 - 3 - 7x$ का मान शून्य है, $2x-3=0$ या $3x+1=0$, अर्थात् $x = \frac{3}{2}$ या $x = \frac{-1}{3}$ हो।

अब, शून्यकों का योग $= \frac{3}{2} - \frac{1}{3} = \frac{9-2}{6} = \frac{7}{6} = \frac{-(-7)}{6} = \frac{-x}{x^2}$ का गुणांक

शून्यकों का गुणनफल $= \frac{3}{2} \times \frac{-1}{3} = \frac{-1}{2} = \frac{-1 \times 3}{2 \times 3} = \frac{-3}{6} = \frac{\text{अचरपद}}{x^2}$ का गुणांक

Page : 36 , Block Name : प्रश्नावली 2.2

(iv) $4u^2 + 8u$

Answer. $4u(u+2)$

समीकरण $4u^2 + 8u$ का मान शून्य है, $4u=0$ या $u+2=0$, अर्थात् $u=0$ हो या $u=-2$ हो।

अब, शून्यकों का योग $= 0 + (-2) = -2 = \frac{-8}{4} = \frac{-x}{x^2}$ का गुणांक

शून्यकों का गुणनफल $= 0 \times (-2) = 0 = \frac{0}{4} = \frac{\text{अचरपद}}{u^2}$ का गुणांक

Page : 36 , Block Name : प्रश्नावली 2.2

(v) $t^2 - 15$

Answer. $t^2 - \sqrt{15}^2 = (t + \sqrt{15})(t - \sqrt{15})$

समीकरण $t^2 - 15$ का मान शून्य है, $t + \sqrt{15} = 0$ या $t - \sqrt{15} = 0$, अर्थात् $t = \sqrt{15}$ या $t = -\sqrt{15}$ हो।

अब, शून्यकों का योग $= -\sqrt{15} + \sqrt{15} = 0 = \frac{-(t)}{t^2}$ का गुणांक

शून्यकों का गुणनफल $= -\sqrt{15} \times \sqrt{15} = -15 = \frac{-15}{1} = \frac{\text{अचरपद}}{t^2}$ का गुणांक

Page : 36 , Block Name : प्रश्नावली 2.2

(vi) $3x^2 - x - 4$

Answer. $3x^2 - 4x + 3x - 4$

$= (x(3x-4) + 1(3x-4))$

$= (3x-4)(x+1)$

समीकरण $3x^2 - x - 4$ का मान शून्य है, $3x-4=0$ या

$x+1=0$, अर्थात् $x = \frac{4}{3}$ या $x=-1$ हो ।

अतः समीकरण $3x^2 - x - 4$ के शून्यक $\frac{4}{3}$ और -1 है ।

अब, शून्यकों का योग $= \frac{4}{3} - 1 = \frac{4-3}{3} = \frac{1}{3} = \frac{-(-1)}{3} = \frac{-(x)}{x^2}$ का गुणांक

शून्यकों का गुणनफल $= \frac{4}{3} \times (-1) = \frac{-4}{3} = \frac{\text{अचरपद}}{x^2}$ का गुणांक

Page : 36 , Block Name : प्रश्नावली 2.2

Q2 एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए , जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएँ हैं ।

(i) $\frac{1}{4}, -1$

Answer. माना $ax^2 + bx + c$ कोई द्विघात बहुपद है । इसके शून्यक α और β है ।

अब, शून्यकों का योग, $\alpha + \beta = \frac{1}{4} = \frac{-b}{a}$

शून्यकों का गुणनफल, $\alpha \times \beta = -1 = \frac{-c}{a}$

तुलना करने पर,

$a=4, b=-1$ और $c=-4$

अतः वह द्विघात बहुपद, जिसमें सभी शर्तें संतुष्ट होती है $4x^2 - x - 4$ है ।

Page : 36 , Block Name : प्रश्नावली 2.2

(ii) $\sqrt{2}, \frac{1}{3}$

Answer. माना $ax^2 + bx + c$ कोई द्विघात बहुपद है । इसके शून्यक α और β है ।

अब,

शून्यकों का योग, $\alpha + \beta = \sqrt{2} = \frac{3}{\sqrt{2} \cdot 3} = \frac{-b}{a}$

शून्यकों का गुणनफल, $\alpha \times \beta = \frac{1}{3} = \frac{c}{a}$

तुलना करने पर,

$a=3, b=-3\sqrt{2}$ और $c=1$

अतः वह द्विघात बहुपद, जिसमें सभी शर्तें संतुष्ट होती है $3x^2 - 3\sqrt{2}x + 1$ है ।

Page : 36 , Block Name : प्रश्नावली 2.2

(iii) $0, \sqrt{5}$

Answer. माना $ax^2 + bx + c$ कोई द्विघात बहुपद है । इसके शून्यक α और β है ।

अब,

शून्यकों का योग, $\alpha + \beta = 0 = \frac{0}{1} = \frac{-b}{a}$

शून्यकों का गुणनफल , $\alpha \times \beta = \sqrt{5} = \frac{\sqrt{5}}{1} = \frac{c}{a}$

तुलना करने पर,

$a=1, b=0$ और $c=\sqrt{5}$

अतः वह द्विघात बहुपद, जिसमें सभी शर्तें संतुष्ट होती है $x^2 + 0.x + \sqrt{5}$ है।

Page : 36 , Block Name : परश्नावली 2.2

(iv) 1,1

Answer. माना $ax^2 + bx + c$ कोई द्विघात बहुपद है। इसके शून्यक α और β है।

अब,

शून्यकों का योग , $\alpha + \beta = 1 = \frac{1}{1} = \frac{-b}{a}$

शून्यकों का गुणनफल , $\alpha \times \beta = 1 = \frac{1}{1} = \frac{c}{a}$

तुलना करने पर,

$a=1, b=-1$ और $c=1$

अतः वह द्विघात बहुपद, जिसमें सभी शर्तें संतुष्ट होती है $x^2 - x + 1$ है।

Page : 36 , Block Name : परश्नावली 2.2

(v) $\frac{-1}{4}, \frac{1}{4}$

Answer. माना $ax^2 + bx + c$ कोई द्विघात बहुपद है। इसके शून्यक α और β है।

अब,

शून्यकों का योग , $\alpha + \beta = \frac{-1}{4} = \frac{-b}{a}$

शून्यकों का गुणनफल , $\alpha \times \beta = \frac{1}{4} = \frac{c}{a}$

तुलना करने पर,

$a=4, b=1$ और $c=1$

अतः वह द्विघात बहुपद, जिसमें सभी शर्तें संतुष्ट होती है, $4x^2 + x + 1$ है।

Page : 36 , Block Name : परश्नावली 2.2

(vi) 4,1

Answer. माना $ax^2 + bx + c$ कोई द्विघात बहुपद है। इसके शून्यक α और β है। अब,

शून्यकों का योग , $\alpha + \beta = 4 = \frac{4}{1} = \frac{-b}{a}$

शून्यकों का गुणनफल , $\alpha \times \beta = 1 = \frac{1}{1} = \frac{c}{a}$

तुलना करने पर,

$a=1, b=-4$ और $c=1$

अतः वह द्विघात बहुपद, जिसमें सभी शर्तें संतुष्ट होती है, $x^2 - 4x + 1$ है।

Page : 36 , Block Name : परश्नावली 2.2

Q1 विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ,निम्न में p(x) को g(x) से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए :

(i) $p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 3, g(x) = x^2 - 2$

Answer.

Handwritten long division of $p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 3$ by $g(x) = x^2 - 2$. The quotient is $x - 3$ and the remainder is $7x - 9$.

भागफल $= x - 3$

शेषफल $= 7x - 9$

Page : 39 , Block Name : प्रश्नावली 2.3

(ii) $p(x) = x^4 - 3x^2 + 4x + 5, g(x) = x^2 + 1 - x$

Answer.

Handwritten long division of $p(x) = x^4 - 3x^2 + 4x + 5$ by $g(x) = x^2 + 1 - x$. The quotient is $x^2 + x - 3$ and the remainder is 8.

भागफल $= x^2 + x - 3$

शेषफल $= 8$

Page : 39 , Block Name : प्रश्नावली 2.3

(iii) $p(x) = x^4 - 5x + 6, g(x) = 2 - x^2$

Answer.

$$p(x) = x^4 - 5x + 6, \quad g(x) = 2 - x^2$$

$$\begin{array}{r}
 \overline{-x^2-2} \\
 -x^2+2 \overline{) x^4-5x+6} \\
 x^4 -2x^2 \\
 \underline{-} + \\
 2x^2 - 5x + 6 \\
 2x^2 -4 \\
 \underline{-} + \\
 -5x + 10
 \end{array}$$

$$\text{भागफल} = -x^2 - 2$$

$$\text{शेषफल} = -5x + 10$$

Page : 39 , Block Name : परश्नावली 2.3

Q2 पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके ,जाँच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणखंडन है :

(i) $t^2 - 3, 2t^4 + 3t^3 - 2t^2 - 9t - 12$

Answer.

$$\begin{array}{r}
 \overline{2t^2+3t+4} \\
 t^2-3 \overline{) 2t^4+3t^3-2t^2-9t-12} \\
 2t^4 -6t^2 \\
 \underline{-} + \\
 3t^3 + 4t^2 - 9t - 12 \\
 -3t^3 -9t \\
 \underline{+} + \\
 4t^2 - 12 \\
 4t^2 - 12 \\
 \underline{-} + \\
 0
 \end{array}$$

चूँकि शेषफल शून्य है , अतः $t^2 - 3, 2t^4 + 3t^3 - 2t^2 - 9t - 12$ का एक गुणखंडन है ।

Page : 40 , Block Name : परश्नावली 2.3

(ii) $x^2 + 3x + 1, 3x^4 + 5x^3 - 7x^2 + 2x + 2$

Answer.

$$\begin{array}{r}
 \overline{3x^2-4x+2} \\
 x^2+3x+1 \overline{) 3x^4+5x^3-7x^2+2x+2} \\
 3x^4 + 9x^3 + 3x^2 \\
 \underline{-} \\
 -4x^3 - 10x^2 + 2x + 2 \\
 -4x^3 - 12x^2 - 4x \\
 \underline{+} + \\
 2x^2 + 6x + 2 \\
 2x^2 + 6x + 2 \\
 \underline{-} \\
 0
 \end{array}$$

चूँकि शेषफल शून्य है, अतः $x^2 + 3x + 1, 3x^4 + 5x^3 - 7x^2 + 2x + 2$ का एक गुणनखंडन है।

Page : 40 , Block Name : प्रश्नावली 2.3

(iii) $x^3 - 3x + 1, x^5 - 4x^3 + x^2 + 3x + 1$

Answer.

$$\begin{array}{r}
 x^3 - 3x + 1 \overline{) x^5 - 4x^3 + x^2 + 3x + 1} \\
 \underline{x^5 - 3x^3 + x^2} \\
 -x^3 + 3x + 1 \\
 \underline{-x^3 + 3x - 1} \\
 2
 \end{array}$$

चूँकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः $x^3 - 3x + 1, x^5 - 4x^3 + x^2 + 3x + 1$ का एक गुणनखंडन है।

Page : 40 , Block Name : प्रश्नावली 2.3

Q3 $3x^4 + 6x^3 - 2x^2 - 10x - 5$ के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, यदि इसके दो शून्यक $\sqrt{\frac{5}{3}}$ और $-\sqrt{\frac{5}{3}}$ है।

Answer. माना $q(x) = 3x^4 + 6x^3 - 2x^2 - 10x - 5$

इस प्रकार $\sqrt{\frac{5}{3}}$ और $-\sqrt{\frac{5}{3}}$, $q(x)$ के शून्यक है।

अतः $x - \sqrt{\frac{5}{3}}$ और $x + \sqrt{\frac{5}{3}}$, $q(x)$ के गुणनखंडन है।

या $x^2 - \frac{5}{3}$, $q(x)$ का गुणनखंडन है।

अब

$$\begin{array}{r}
 x^2 - \frac{5}{3} \overline{) 3x^4 + 6x^3 - 2x^2 - 10x - 5} \\
 \underline{3x^4 - 5x^2} \\
 6x^3 + 3x^2 - 10x - 5 \\
 \underline{6x^3 - 10x} \\
 3x^2 - 5 \\
 \underline{3x^2 - 5} \\
 0
 \end{array}$$

$$\Rightarrow 3x^4 + 6x^3 - 2x^2 - 10x - 5 = \left(x^2 - \frac{5}{3}\right)(3x^2 + 6x + 3)$$

$$= 3\left(x^2 - \frac{5}{3}\right)(x^2 + 2x + 1)$$

इस प्रकार, $p(x)=$
 $3(x^2 - \frac{5}{3})(x^2 + x + x + 1)$
 $= 3(x^2 - \frac{5}{3})[x(x + 1) + 1(x + 1)]$
 $= 3(x^2 - \frac{5}{3})(x + 1)(x + 1)$

इसलिए $3x^4 + 6x^3 - 2x^2 - 10x - 5$ के शून्यक $\sqrt{\frac{5}{3}}, -\sqrt{\frac{5}{3}}, -1$ और -1 है ।

Page : 40 , Block Name : प्रश्नावली 2.3

Q4 यदि $x^3 - 3x^2 + x + 2$ को एक बहुपद $g(x)$ से भाग देने पर , भागफल और शेषफल क्रमशः $x-2$ और $-2x+4$ हैं तो $g(x)$ ज्ञात कीजिए ।

Answer. $g(x)=$ भाजक

भागफल= $x-2$

भाज्य= $x^3 - 3x^2 + x + 2$

शेषफल= $-2x+4$

हमें ज्ञात है,

भाज्य= भाजक $\times$ भागफल+ शेषफल


अतः,

$$x^3 - 3x^2 + x + 2 = g(x) \times (x - 2) + (-2x + 4)$$

$$x^3 - 3x^2 + x + 2 - (-2x + 4) = g(x) \times (x - 2)$$

$$\Rightarrow g(x) \times (x - 2) = x^3 - 3x^2 + x + 2 + 2x - 4$$

$$\Rightarrow = \frac{(x^3 - 3x^2 + x + 2)}{(x - 2)}$$



Handwritten long division of $x^3 - 3x^2 + 3x - 2$ by $x - 2$. The quotient is $x^2 - x + 1$ and the remainder is 0.

अतः , $g(x)=x^2 - x + 1$

Page : 40 , Block Name : प्रश्नावली 2.3

Q5 बहुपदों $p(x), q(x), g(x)$ और $r(x)$ के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों तथा

Answer. यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा $p(x)=g(x) \times q(x)+r(x)$ जहाँ $q(x) \neq 0$, घात $r(x)=0$ या घात $r(x)<$ घात $g(x)$

(i) घात $p(x)=$ घात $q(x)$

Answer. भाज्य और भागफल की घात समान होने के लिये आवश्यक है जब भाजक एक अचर (घात 0 हों) संख्या हो ।

$$\text{माना } p(x) = 3x^2 - 6x + 5$$

$$\text{माना } g(x) = 3$$

$$\text{अतः, } q(x) = x^2 - 2x + 1 \text{ और } r(x) = 2$$

$$(ii) \text{ घात } q(x) = \text{घात } r(x)$$

$$\text{Answer. माना } p(x) = 2x^2 - 4x + 3$$

$$\text{माना } g(x) = x^2 - 2x + 1$$

$$\text{अतः, } q(x) = 2 \text{ और } r(x) = 1$$

$$(iii) \text{ घात } r(x) = 0$$

$$\text{Answer. माना } p(x) = 2x^2 - 4x + 3$$

$$\text{माना } g(x) = x^2 - 2x + 1$$

$$\text{अतः, } q(x) = 2 \text{ और } r(x) = 1$$

Page : 40 , Block Name : परश्नावली 2.3

Q1 सत्यापित कीजिए की निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएँ उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए:

$$(i) 2x^3 + x^2 - 5x + 2; \frac{1}{2}, 1, -2$$

$$\text{Answer. माना } p(x) = 2x^3 + x^2 - 5x + 2$$

$$p\left(\frac{1}{2}\right) =$$

$$2\left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 5\left(\frac{1}{2}\right) + 2$$

$$= 2 \times \frac{1}{8} + \frac{1}{4} - 5 \times \frac{1}{2} + 2$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{5}{2} + 2$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{5}{2} + 2$$

$$= \frac{1 - 5 + 4}{2} = \frac{0}{2}$$

$$= 0$$

$$\text{अतः, } p\left(\frac{1}{2}\right), p(x) \text{ का शून्यक है।}$$

$$p(1) = 2(1)^3 + 1^2 - 5(1) + 2 = 2 + 1 - 5 + 2 = 5 - 5 = 0$$

$$\text{अतः } 1, p(x) \text{ का शून्यक है।}$$

$$p(-2) = 2(-2)^3 + (-2)^2 - 5(-2) + 2 = 2(-8) + 4 + 10 + 2 = -16 + 16 = 0$$

$$\text{अतः } -2, p(x) \text{ का शून्यक है।}$$

$$\text{माना } \alpha = \frac{1}{2}, \beta = 1 \text{ तथा } \gamma = -2$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta + \gamma = \frac{1}{2} + 1 - 2 = \frac{1 + 2 - 4}{2} = -\frac{1}{2} = \frac{-}{(x^2)} x^3 \text{ का गुणांक}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha &= ((\frac{1}{2} \times 2) \times 1) + (1 \times -2) + (-2 \times \frac{1}{2}) \\ &= \frac{1}{2} - 2 - 1 = \frac{1 - 4 - 2}{2} = \frac{-5}{2} \\ &= \frac{x}{x^3}\end{aligned}$$

का गुणांक

$$\Rightarrow \alpha\beta\gamma = \frac{1}{2} \times 1 \times (-2) = -1 = \frac{-2}{2} = -\frac{(\text{अचरपद})}{x^3} \text{ का गुणांक}$$

Page : 40 , Block Name : प्रश्नावली 2.4

(ii) $x^3 - 4x^2 + 5x - 2$; 2, 2, 1

Answer. माना $p(x)=x^3 - 4x^2 + 5x - 2$

$$p(2)=(1)^3 - 4(2)^2 + 5 \times 2 - 2 = 8 - 16 + 10 - 2 = 18 - 18 = 0$$

अतः 2 , $p(x)$ का शून्यक है।

$$p(1)=(1)^3 - 4(1)^2 + 5 \times 1 - 2 = 1 - 4 + 5 - 2 = 6 - 6 = 0$$

अतः 1 , $p(x)$ का शून्यक है।

माना $\alpha = 2, \beta = 1$ और $\gamma = 1$

$$\Rightarrow \alpha + \beta + \gamma = 2 + 1 + 1 = 4 = -\frac{(-4)}{1} = -\frac{(-4)}{x^2 \text{ का गुणांक}} x^3 \text{ का गुणांक}$$

$$\Rightarrow \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 2 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 2 = 5 = \frac{5}{1} = \frac{x}{x^3} \text{ का गुणांक}$$

$$\alpha\beta\gamma = 2 \times 1 \times 1 = 2 = \frac{-}{(-2)} 1 = -\frac{(\text{अचरपद})}{x^3} \text{ का गुणांक}$$

Page : 40 , Block Name : प्रश्नावली 2.4

Q2 एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग , दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2,-7,-14 हो।

Answer. माना $p(x)=ax^3 + bx^2 + cx + d$ एक त्रिघात बहुपद है। α, β तथा γ इसके शून्यक हैं।

अब ,

$$\alpha + \beta + \gamma = 2 = \frac{-(x^2)}{x^3} \text{ का गुणांक} = \frac{-b}{a}$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -7 \frac{x}{x^3} \text{ का गुणांक} = \frac{c}{a}$$

$$\alpha\beta\gamma = -14 = -\frac{(\text{अचरपद})}{x^3} \text{ का गुणांक} = \frac{-d}{a}$$

$$\Rightarrow \frac{-b}{a} = -\frac{7}{1}, \frac{c}{a} = \frac{-7}{1}, \frac{-d}{a} = \frac{-14}{1}$$

$$\text{अतः } p(x)=x^3 - 2x^2 - 7x + 14$$

Page : 40 , Block Name : प्रश्नावली 2.4

Q3 यदि बहुपद $x^3 - 3x^2 + x + 1$ के शून्यक $a-b, a, a+b$ हो, तो a और b ज्ञात कीजिए।

Answer.

शून्यकों का योगफल = $\frac{-(x^2)}{x^3}$ का गुणांक

$\Rightarrow (a - b) + a + (a + b) = \frac{-(-3)}{1}$

$\Rightarrow 3a = 3$

$\Rightarrow a = 1$

शून्यकों के गुणनफल = $-\frac{(\text{अचरपद})}{x^3}$ का गुणांक

$\Rightarrow (a - b)a(a + b) = \frac{-1}{1}$

$\Rightarrow (a^2 - b^2)a = -1$

$\Rightarrow (1 - b^2) = -1$

[क्योंकि $a=1$]

$\Rightarrow b^2 = 1 + 1 = 2$

$\Rightarrow b = \pm\sqrt{2}$

इसलिए, $a=1$ और $b = \pm\sqrt{2}$

Page : 40 , Block Name : परश्नावली 2.4

Q4 यदि बहुपद $p(x)=x^4 - 6x^3 - 26x^2 + 138x - 35$ के दो शून्यक $2 \pm \sqrt{3}$ हों , तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए ।

Answer. माना $p(x)= x^4 - 6x^3 - 26x^2 + 138x - 35$

$p(x)$ के दो शून्यक $2 + \sqrt{3}$ और $2 - \sqrt{3}$ है ।

इसलिए $x - 2 - \sqrt{3}$ और $x - 2 + \sqrt{3}$, $p(x)$ के दो गुणनखंड है ।

इसलिए $(x - 2)^2 - (\sqrt{3})^2$ बहुपद $p(x)$ का गुणनखंड है ।

$p(x)=x^4 - 6x^3 - 26x^2 + 138x - 35$

Handwritten polynomial division showing the division of $p(x)$ by $(x^2 - 4x + 1)$ to find the remaining quadratic factor.

इसलिए, $p(x)=(x^2 - 4x + 1)(x^2 - 2x - 35) - (x^2 - 4x + 1)(x^2 - 7x + 5x - 35)$

$x^4 - 6x^3 - 26x^2 + 138x - 35 = (x^2 - 4x + 1)(x - 7)(x + 5)$

$x+5=0$, $x-7=0$

$x=-5$, $x=7$

अतः $x=-5$ या $x=7$ अन्य शून्यक है ।

Page : 40 , Block Name : प्रश्नावली 2.4

Q5 यदि बहुपद $x^4 - 6x^3 + 16x^2 - 25x + 10$ को एक अन्य बहुपद $x^2 - 2x + k$ से भाग दिया जाए और शेषफल $x+a$ आता हो ,तो k तथा a ज्ञात कीजिए ।

Answer. भाजक= $x^2 - 2x + k$

भाज्य= $x^4 - 6x^3 + 16x^2 - 25x + 10$

शेषफल= $x+a$

हमें ज्ञात है,

भाज्य= भाजक $\times$ भागफल + शेषफल

$$x^4 - 6x^3 + 16x^2 - 25x + 10 = (x^2 - 2x + k) \times \text{भागफल} + (x + 2)$$

$$\Rightarrow x^4 - 6x^3 + 16x^2 - 25x + 10 - x - a = (x^2 - 2x + k) \times \text{भागफल}$$

$$\Rightarrow \text{भागफल} = \frac{x^4 - 6x^3 + 16x^2 - 25x + 10 - a}{x^2 - 2x + k}$$

यदि बहुपद $x^4 - 6x^3 + 16x^2 - 25x + 10 - a$ को $x^2 - 2x + k$ से भाग दिया जाए शेषफल 0 होगा ।
इसलिए ,

Handwritten polynomial division:

$$\begin{array}{r} x^2 - 2x + k \overline{) x^4 - 6x^3 + 16x^2 - 25x + 10 - a} \\ \underline{x^4 - 2x^3 + 16x^2} \\ -4x^3 + (16-k)x^2 - 25x \\ \underline{-4x^3 + 8x^2 - 4kx} \\ (8-k)x^2 - (26-4k)x + 10 - a \\ \underline{(8-k)x^2 - (16-2k)x + (8k-k^2)} \\ (-10+2k)x + (10-a-8k+k^2) \end{array}$$

तुलना करने पर

$$-10 + 2k = 0 \Rightarrow k = \frac{10}{2} = 5$$

और

$$10 - a - 8k + k^2 = 0$$

$$10 - a - 8 \times 5 + 5^2 = 0$$

$$10 - a - 40 + 25 = 0$$

$$a = -40 + 35 = -5$$

अतः $a = -5$ तथा $k = 5$

Page : 40 , Block Name : प्रश्नावली 2.4