

પ્રશ્નપત્ર: પુ

ગણિત-1 (050)

પ્રશ્ન-1 (અ)

(1) R^2 માં અંતરસ્પૃશ્ય મેળવો તથા અંતરસ્પૃશ્યતા ગુણધર્મો જણાવો. (3)

(2) $\overline{AB}$ નાં ત્રિભાગબિંદુઓ $(1, 2)$ અને $(-2, 4)$ હોય તો A અને B નાં યામ મેળવો. (1)

(બ) કોઈ પણ બે ગણો. (4)

(1) $\triangle ABC$ માં D, E નું મધ્યબિંદુ હોય તો સાબિત કરો કે $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$

(2) $A(1, -2)$ અને $B(-3, 4)$ ને જોડતા રેખાખંડને n એકરૂપ ભાગમાં વિભાગતાં બિંદુઓનાં યામ શોધો. જો $n=10$ હોય અને A તરફથી x માં બિંદુના યામ $(-9/5, b)$ હોય તો x અને b શોધો.

(3) $(5, 2), (3, 6), (2, 4)$ એ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણનાં ત્રણ શિરોબિંદુઓ હોય તો, ચોથા શિરોબિંદુના યામ મેળવો.

(ક) કોઈ પણ બે ગણો. (4)

(1) રેખાઓ $3x + y + 4 = 0$, $3x + 4y - 15 = 0$ અને $24x - 7y - 3 = 0$ કોઈ ત્રિકોણની બાજુઓને સમાવતી રેખાઓ હોય તો તે ત્રિકોણ સમઘ્રિલૂપ છે. તેમ સાબિત કરો.

(2) એક ચોરસનાં પાસપાસેનાં શિરોબિંદુઓ $(-1, 3)$ અને $(2, -1)$ છે. તો ચોરસનાં અન્ય શિરોબિંદુઓનાં યામ શોધો.

(૩) $P(a \cos \alpha, b \sin \alpha)$, $Q(a \cos \beta, b \sin \beta)$ બિંદુઓમાંથી પસાર થતી રેખાનું સમી.

$$\frac{x}{a} \cdot \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) + \frac{y}{b} \cdot \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) = \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \text{ છે.}$$

તેમ સાબિત કરો.

(૬) સમક્રિતિક કે શિશોલંબ ન હોય તેવી રેખાનું કાર્તેઝીય સમી. મેળવો. (૩)

પ્રશ્ન-2 (અ)

(૧) R^2 માં વ્યાપક સમપરિમાણ દ્વિઘાત સમી.

$$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0, \quad a^2 + b^2 + h^2 \neq 0$$

બે રેખાઓ દર્શાવે તે માટેની શરત મેળવો. (૩)

(૨) રેખાઓ $x=2$ અને $x-y+5=0$ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ શોધો. (૧)

(બ)

(૧) લંબચ્છેદી વર્તુળોની વ્યાખ્યા આપો. તથા બે વર્તુળો, લંબચ્છેદી હોવા માટેની આવશ્યક શરતો મેળવો. (૨)

(૨) $4x - 8y + 10 = 0$ અને $2x - 4y + 5 = 0$ નો છેદગાળો શોધો. (૧)

(૩) $2x + ky - 5 = 0$, $4x - y - 3 = 0$ અને $kx - y - 2 = 0$ રેખાઓ સંગામી હોય તો k શોધો. (૧)

(કુ)

(1) રેખા $y = mx$ ના વર્તુળ $x^2 + y^2 - 2ax = 0$ સાથેનાં છેદબિંદુઓ જેનાં વ્યાસોત બિંદુઓ હોય તેવા વર્તુળનું સમીકરણ શોધો. (3)

અથવા

(1) વર્તુળની બહારના બિંદુ P માંથી વર્તુળને દોરેલી સ્પર્શક રેખાઓ પરસ્પર લંબ હોય તો P નો બિંદુગાળ શોધો.

(2) વર્તુળ $x^2 + y^2 = 25$ ને $(3, 4)$ બિંદુએ સ્પર્શક તથા અભિલંબના સમીકરણ મેળવી. (1)

(2) $3x + 4y - 8 = 0$ થી 3 એકમ દૂર આવેલાં રેખા $3x - 2y - 2 = 0$ પરનાં બિંદુઓ શોધો. (3)

અથવા

(2) ત્રિકોણની બાજુઓને સમાવતી રેખાઓનાં સમીકરણો $y = m_1x + c_1$, $y = m_2x + c_2$ અને $x = 0$ છે. આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો. (3)

પ્રશ્ન-3 (અ)

(1) રેખા $y = mx + c$ એ પરવલયની સ્પર્શક બને તેની શરત તથા સ્પર્શબિંદુઓના નામ મેળવી. (2)

(2) પરવલયનાં બિંદુઓ $P(t_1)$, $Q(t_2)$ અને $R(t_3)$ છે. ΔPQR નું ક્ષેત્રફળ

$a^2 |(t_1 - t_2)(t_2 - t_3)(t_3 - t_1)|$ છે એમ બતાવી. (2)

અથવા

(2) રેખા $xc \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ પરવલય
 $y^2 = 4ax$ ને સ્પર્શે તે માટેની શરત મેળવી.

(બી)

(1) ઉપવલયના નાલિઓ S અને S' હોય અને P
 ઉપવલય પરનું બિંદુ હોય તો સાબિત કરો કે
 $SP + S'P = 2a$ (2)

(2) ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ના કોઈપણ બિંદુ પર આગળના સ્પર્શક
 નું નાલિ S અને લંબ અંતર P હોય
 તો સાબિત કરો કે

$$SP = \frac{2ap^2}{b^2 + p^2} \quad (2)$$

અથવા

(2) ઉપવલયના નાલિ S માંથી પસાર થતી ચુવા
 PQ છે. તથા $P (a \cos \theta, b \sin \theta)$ હોય તો
 બતાવો કે (1) $SP \cdot S'P = a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta$
 (2) $\Delta S'PQ$ ની પરિમિતિ અચળ છે.

(કુ)

(1) અલિવલયનાં બિંદુ (x_1, y_1) આગળના સ્પર્શકનું
 સમી. મેળવી. (2)

(2) રેખા $21x + 5y = 116$ અલિવલય $7x^2 - 5y^2 = 232$ ને
 સ્પર્શે છે. તેમ બતાવો. (2)

(ડ)

(1) રેખા $(-4, 0), (4, 0)$ અને અનંત સ્પર્શકો

$y = \pm \frac{5}{4}x$ માટે અલિવલયનું સમી. મેળવી (1)

- (2) વર્તુળો $x^2 + y^2 + 2gx + a^2 = 0$ અને $x^2 + y^2 + 2 + y + a^2 = 0$ પરસ્પર બહારથી સ્પર્શતો બતાવો કે $g^{-2} + f^{-2} = a^{-2}$. (2)

પ્રશ્ન- 4 (અ)

$$7x^2 - 20cy + 12\sqrt{2}x - 36\sqrt{2}y + 72 = 0$$

કયા વક્રનું નિરૂપણ થાય છે? વક્રના નામ,

નિયામિકા, અક્ષોની લંબાઈ, તથા કેન્દ્રના યામ

શીધો. ઉલ્લેખિત શીધો (4)

અથવા

નીચેના વક્રોની સમીકરણો પ્રમાણિત

રૂપમાં ફેરવીને આપો. (4)

(1) $xc^2 = 8x + 8y + 11 = 0$

(2) $xy = 6$

(બ)

(1) R^2 ના બે સદિશો સમાન હોય તો તેમના

માન તથા દિશા સમાન થાય તેમ સાબિત કરો. (2)

(2) ઓ કોઈ સદિશ કે, x અને y -અક્ષ સાથે

અનુક્રમે $\pi/4$ અને $\pi/3$ ના માપના ખૂણા બનાવે તો

તે z -અક્ષ સાથે કેટલા માપનો ખૂણો બનાવશે

તે શીધો. (2)

(ક)

(1) પ્રચલીત સંકેતોમાં R^2 તથા R^3 ના સદિશો

માટે ત્રિકોણનું કોણ તારવો. (2)

(2) $\triangle ABC$ નું મધ્યકેન્દ્ર બાદ છે. P એ $\triangle ABC$ ના સમતલનું બિંદુ છે. તો $\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} = \vec{0}$ સાબિત કરી. $(P \neq A, B, C, G)$ (2)

(5)

(1) એક કબા ઉપર $2\sqrt{10}$ એકમ બળ $3\vec{i} - \vec{j}$ ની દિશામાં અને $3\sqrt{13}$ એકમનું બળ $2\vec{i} + 3\vec{j}$ ની દિશામાં લગાડતાં તેનું સ્થાનાંતર $A(1, 2)$ થી $B(6, 4)$ સુધી થતું હોય તો થયેલ કાર્ય શોધો. (2)

(2) એ $\vec{OC} = \vec{I} + \vec{J}$, $\vec{OJ} = t\vec{I} - \vec{J}$ વચ્ચેની ખૂણાનું માપ $3\pi/4$ છે. તો t શોધો. (1)

પ્રશ્ન-5 (અ)

(1) અવકાશનાં ત્રિણ બિંદુઓ $A(\vec{a})$, $B(\vec{b})$, $C(\vec{c})$ સમરેખ હોય તો અને તો જ શૂન્યોત્તર વાસ્તવિક સંખ્યાઓ l, m, n મળે કે જેથી $l\vec{a} + m\vec{b} + n\vec{c} = \vec{0}$ અને $l + m + n = 0$ (2)

(2) સમાંતર રેખાઓ $\vec{r} = \vec{a} + k\vec{I}$, $k \in \mathbb{R}$ અને $\vec{r} = \vec{b} + k\vec{I}$, $k \in \mathbb{R}$ માંથી પસાર થતા સમતલનું સમીકરણ મેળવો. (2)

(બ)

(1) સમીકરણ $x^2 + y^2 + z^2 + 2px + 2qy + 2rz + d = 0$ ગોલક દર્શાવે તે માટેની આવશ્યક અને પર્યાપ્ત શરત મેળવો લઘા લેના ઉદ્ધ અને ત્રિજ્યા મેળવો. (1)

(2) રેખાઓ $\frac{x-3}{2} = \frac{y+15}{-7} = \frac{z-9}{5}$ અને $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-9}{-3}$ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર શોધો. (3)

અથવા

(2) રેખાઓ $x-1 = y+2 = z-3$ અને $x-2 = y+3 = z-5$ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર શોધો. (3)

(3)

(1) $C(1, 1, 3)$ $C(4, 3, 2)$ $C(5, 2, 7)$ $C(6, 4, 8)$ શિરોબિંદુઓ

વાળા ચતુષ્કોણનું દાનજલ શોધો. (2)

(2) $C(2, -1, 2)$ માંથી સમતલ $2x-3y+4z=44$

પરના લંબની લંબાઈ તથા લંબરેખાનું સમીકરણ.

મોળવી

(2)

(3) $A(1, 0, -1)$ $B(-1, 1, 0)$ $C(0, -1, 1)$ બિંદુઓમાંથી

પસાર થતા ગોળનું સમીકરણ શોધો જેનું કેન્દ્ર

સમતલ ABC પર ઊંચ.

(3)

અથવા

(3) $C(1, 2, 3)$ અને $C(3, -1, 2)$ બિંદુઓમાંથી પસાર

થતા અને સમતલ $x+3y+2z=7$ ને લંબ

સમતલનું સમીકરણ શોધો.

(3)

જવાબો
પ્રશ્નપત્ર-4


પ્ર:1(અ)

(1) $\mathbb{R}^2$ માં અંતર શ્રેણી:

ધારીકે $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ છે.

અમી એ સાપેક્ષ $\overline{AB}$ ના સ્થાન માટે ≥ 0 વિકલ્પી

વિકલ્પ (1) $\overline{AB}$ સમક્ષિતિજ છે.




AB માંથી X-અક્ષ પર લંબ પાડે અનુક્રમે

M અને N છે. M, N ના યામ અનુક્રમે

$(x_1, 0)$, $(x_2, 0)$ થશે

અહીં $AB = MN$

$$= |x_1 - x_2|$$



વિકલ્પ 2. $\overline{AB}$ શિરીલંબ છે.


A, B માંથી Y-અક્ષ પર લંબ પાડે અનુક્રમે M', N'

મીળવી. M', N' ના યામ અનુક્રમે $(0, y_1)$, $(0, y_2)$ થશે

અહીં $AB = M'N'$

$$= |y_1 - y_2|$$

વિકલ્પ 3. $\overline{AB}$ સમક્ષિતિજ કે શિરીલંબ નથી.



A અને B માંથી X-અક્ષ પરનાં લંબ પાડે

અનુક્રમે M અને N છે Y-અક્ષ પરનાં

લંબ પાડે અનુક્રમે M' અને N' છે. B

માંથી $\overline{AM}$ પરનાં લંબ પાડે છે. M, N,

M', N' અને C ના યામ અનુક્રમે

$(x_1, 0)$, $(x_2, 0)$, $(0, y_1)$, $(0, y_2)$

અને (x_1, y_2) મળશે

$$AB^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2$$

$$AB = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \quad \text{--- (X)}$$

વધુમાં $\overline{AB}$ સમન્નિત હોય ત્યારે $y_1 = y_2$ અને $\overline{AB}$ શિરીબિંદુ હોય ત્યારે $x_1 = x_2$ થાય.

∴ $\otimes$ અંતર સૂત્ર છે.

R^2 ના અંતર સૂત્રના ગુણધર્મો:

પ્રત્યેક $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3) \in R^2$ માટે

(i) $d(A, B) \geq 0$

(ii) $d(A, B) = 0 \Leftrightarrow A = B$

(iii) $d(A, B) = d(B, A)$

(iv) $d(A, B) \leq d(A, C) + d(C, B)$

ય: 1 (બ)

(1) $\triangle ABC$ માં D, E નું મધ્યબિંદુ છે.

ધારીકે $D(0,0)$ છે. અને $A(b,c)$ છે.

$BD = CD = a \quad (a \neq 0)$

∴ $B(-a, 0), C(a, 0)$ થાય

હવે $AB^2 + AC^2$
 $= (b+a)^2 + (c-0)^2 + (b-a)^2 + (c-0)^2$
 $= 2(a^2 + b^2 + c^2) \dots \dots \dots (i)$

તથા $2[AD^2 + BD^2]$
 $= 2[(b-0)^2 + (c-0)^2 + (-a-0)^2 + (0-0)^2]$
 $= 2(a^2 + b^2 + c^2) \dots \dots \dots (ii)$

(i) અને (ii) પરથી

$AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$

(2) $\rightarrow A(1, -2)$ અને $B(-3, 4)$ ને જોડતાં રેખાખંડ નાં n ભોક્કણ ભાગ કરતાં બિંદુઓ અનુક્રમે $P_1, P_2, P_3, \dots, P_{n-1}$ છે.

અહીં P_2 બિંદુ $\overline{AB}$ નું A તરફ થી $\frac{n}{n-2}$ ગુણોત્તર માં વિભાજન કરશે.

∴ P_2 ના યામ $= \left[\frac{nx_2 + ny_1}{n+1}, \frac{my_2 + ny_1}{m+1} \right]$
 $= \left[\frac{2(-3) + (n-2)(1)}{2+n-2}, \frac{2(4) + (n-2)(-2)}{2+n-2} \right]$

$$= \left[\frac{n-4r}{n}, \frac{6r-2n}{n} \right] \quad r = 1, 2, 3, \dots, n-1$$

અહીં $n = 10$ અર્થે r માં પાંદું પૂરે ના વામ $(-\frac{9}{5}, b)$ છે.

$$\therefore -\frac{9}{5} = \frac{n-4r}{n}$$

$$\therefore -\frac{9}{5} = \frac{10-4r}{10}$$

$$\therefore -18 = 10 - 4r$$

$$4r = 28$$

$$\boxed{r = 7}$$

$$b = \frac{6r-2n}{n}$$

$$= \frac{6(7) - 20}{10}$$

$$= \frac{22}{10}$$

$$\boxed{b = \frac{11}{5}}$$

(3) $\rightarrow A(5, 2), B(3, 6), C(2, 4)$ આપેલા પાંદુંઓ છે.

પિકલ (i) માં $\square ABCD$ અમાંતર બાજુ અનુક્રીણા

હોય તો $\overline{AC}$ નું મધ્યપાંદું = $\overline{BD}$ નું મધ્યપાંદું


$$\therefore \left(\frac{7}{2}, \frac{6}{2} \right) = \left(\frac{3+x}{2}, \frac{6+y}{2} \right)$$

$$\therefore 7 = 3+x$$

$$6 = 6+y$$

$$\boxed{x = 4}$$

$$\boxed{y = 0}$$




$\therefore$ અોચા પાંદુંપાંદું D ના વામ $(4, 0)$.

$\rightarrow$ પિકલ (ii) માં $\square ABDC$ અમાંતર બાજુ અનુક્રીણા

હોય તો, $\overline{AD}$ નું મધ્યપાંદું = $\overline{BC}$ નું મધ્યપાંદું

$$\therefore \left(\frac{oc+5}{2}, \frac{2+y}{2} \right) = \left(\frac{3+2}{2}, \frac{6+4}{2} \right)$$



$$\therefore oc+5 = 5, \quad 2+y = 10$$

$$\therefore \boxed{oc = 0}$$

$$\therefore \boxed{y = 8}$$

$\therefore D$ ના વામ $(0, 8)$.

$\rightarrow$ પિકલ (iii) માં $\square ACBD$ અમાંતર બાજુ હોય તો

$\overline{AB}$ નું મધ્યપાંદું = $\overline{CD}$ નું મધ્યપાંદું

$$= \left[\frac{5+3}{2}, \frac{2+6}{2} \right] = \left[\frac{2+oc}{2}, \frac{4+y}{2} \right]$$

$$\therefore x = 2 + \alpha$$

$$y = 4 + \beta$$

$$\therefore \alpha = 6$$

$$\beta = 4$$

$$\therefore \text{D ના યામ} = (6, 4)$$

$$[8] \langle 1 \rangle \text{ રેખાઓ } 3x + y + 4 = 0, 3x + 4y - 15 = 0$$

અને $24x - 7y - 3 = 0$ કીઈ ત્રિકોણ ની બાજુઓ ની સમાવતી રેખા હોય ની આ ત્રિકોણ સમઘુલ્લુ છે એમ સાબિત કરો.

$$l_1 : 3x + y + 4 = 0 \text{ ની ઢાળ} = \frac{-3}{1} = -3$$

$$l_2 : 3x + 4y - 15 = 0 \text{ ની ઢાળ} = \frac{-3}{4}$$

$$l_3 : 24x - 7y - 3 = 0 \text{ ની ઢાળ} = \frac{24}{7}$$

$$l_1 \text{ અને } l_2 \text{ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ} = \tan^{-1} \left| \frac{-3 + \frac{3}{4}}{1 + 3(\frac{3}{4})} \right|$$

$$= \tan^{-1} \frac{9}{13}$$

$$l_2 \text{ અને } l_3 \text{ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ} = \tan^{-1} \left| \frac{-\frac{3}{4} - \frac{24}{7}}{1 - \frac{3}{4}(\frac{24}{7})} \right|$$

$$= \tan^{-1} \frac{117}{44}$$

$$l_3 \text{ અને } l_1 \text{ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ} = \tan^{-1} \left| \frac{\frac{24}{7} + 3}{1 - \frac{24}{7}(-3)} \right|$$

$$= \tan^{-1} \frac{9}{13}$$

ત્રિકોણના બે ખૂણાઓના માપ સમાન છે.

$\therefore$ ત્રિકોણ સમઘુલ્લુ ત્રિકોણ છે.

$$\langle 2 \rangle \longrightarrow \text{અંત A } (-1, 3) \text{ અને B } (2, -1)$$

$$AB = 5$$

$$\overleftrightarrow{AB} \text{ ની ઢાળ} = \frac{-1-3}{2+1} = -\frac{4}{3}$$

$$\overleftrightarrow{AD} \text{ ની નીમજ } \overleftrightarrow{BC} \text{ ની ઢાળ} = \frac{3}{4}$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{3}{4} \therefore \sin \theta = \frac{3}{5} \text{ અને}$$

$$\cos \theta = \frac{4}{5} \quad (0 < \theta < \frac{\pi}{2})$$

(i) A (-1, 3) થી 5 એકમ અંતરે આવેલાં બિંદુના ચામ,

$$= (-1 \pm 5 \left(\frac{4}{5}\right), 3 \pm 5 \left(\frac{3}{5}\right))$$

$$= (-1 \pm 4, 3 \pm 3)$$

$$= \boxed{(3, 6) \text{ અને } (-5, 0)}$$

(ii) B (2, -1) થી 5 એકમ અંતરે આવેલાં બિંદુના ચામ,

$$= \left[2 \pm 5 \left(\frac{4}{5}\right), -1 \pm 5 \left(\frac{3}{5}\right) \right]$$

$$= (2 \pm 4, -1 \pm 3)$$

$$= \boxed{(6, 2) \text{ અને } (-2, -4)}$$

<3> $\rightarrow$ P ($a \cos \alpha$, $b \sin \alpha$) અને Q ($a \cos \beta$, $b \sin \beta$)
ગાંધી પક્ષીર થતી હોવાનું સાબીત કરણ.

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ a \cos \alpha & b \sin \alpha & 1 \\ a \cos \beta & b \sin \beta & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore x(b \sin \alpha - b \sin \beta) - y(a \cos \alpha - a \cos \beta) +$$

$$(ab \cos \alpha \cdot \sin \beta - a \sin \alpha \cdot \cos \beta) = 0.$$

$$\therefore bx (\sin \alpha - \sin \beta) - ay (\cos \alpha - \cos \beta) -$$

$$ab \sin (\alpha - \beta) = 0$$

$$\therefore bx \left[2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cdot \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \right] - ay \left[-2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cdot \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \right]$$

$$= ab \left(2 \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \right]$$

$$\therefore bx \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) + ay \cdot \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) = ab \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\therefore \frac{x}{a} \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) + \frac{y}{b} \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) = \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right).$$

[S] <1> $\longrightarrow$ કીલ પદ્ય રેખાનું કાર્તેઝિયન સમીકરણ :

દાશી કે $A(x_1, y_1)$ નથા $B(x_2, y_2)$

સમતલ નાં ભિન્ન બિંદુ ઘો છે. ઘને $\overleftrightarrow{AB}$

શિશીલંબ કે સમક્ષિતિજ નથી. ઘાચી $xy \neq x_2$

નથા $y_1 \neq y_2$

જો $P(x, y)$ ઘો $\overleftrightarrow{AB}$ પદ્યનું કીલ બિંદુ હોય તો

$$x = tx_2 + (1-t)x_1, t \in \mathbb{R}$$

$$y = ty_2 + (1-t)y_1, t \in \mathbb{R}$$

$$\therefore x = t(x_2 - x_1) + x_1$$

$$\therefore x - x_1 = t(x_2 - x_1) \text{ નથા તે જ રીતે}$$

$$y - y_1 = t(y_2 - y_1)$$

$$\therefore (x - x_1)(y_2 - y_1) - (y - y_1)(x_2 - x_1) = 0$$

$$\therefore \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x - x_1 & y - y_1 & 1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$C_{31}(x_1), C_{32}(y_1)$ કરતાં

$$\therefore \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x & y & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

ઘાચી ભીલું $\begin{vmatrix} x_1 & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$ તો સપર હો કે

$$(x - x_1)(y_2 - y_1) = (y - y_1)(x_2 - x_1)$$

$x_1 \neq x_2$ નથા $y_1 \neq y_2$ હોવાચી $\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = t$

$$\therefore x = tx_2 + (1-t)x_1$$

$$y = ty_2 + (1-t)y_1$$

$$\therefore P(x, y) \in \overleftrightarrow{AB}$$

$\therefore \overleftrightarrow{AB}$ પરના બિંદુઓ અને માત્ર તે જ બિંદુઓ માટે

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ થી } \overleftrightarrow{AB} \text{ નું કાર્તેઝિયન સમીકરણ છે.}$$

(1) અને (2) ના વ્યાપારે કોઈ પણ રેખાનું કાર્તેઝિયન

$$\text{સમીકરણ } \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

પ્રશ્ન : 2 $[A] \langle 1 \rangle \rightarrow \mathbb{R}^2$ માં વ્યાપક સમયવિભાગો દ્વારા
સમીકરણ

$$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0, a^2 + h^2 + b^2 \neq 0$$

બે રેખાઓ દર્શાવી તે માટેની શરત.

(i) જો $b = 0$ તો સમીકરણ રેખાઓ $x = 0$ અને

$$ax + 2hy = 0 \text{ દર્શાવે છે.}$$

(ii) જો $b \neq 0$ તો ઉગમબિંદુ સિવાયના બે જ બિંદુઓ

(x, y) માટે $x \neq y$ હોય તો સમીકરણ $ax^2 +$


$$2hxy + by^2 = 0, a^2 + b^2 + h^2 \neq 0 \dots (i)$$

$$b\left[\frac{y}{x}\right]^2 + 2h\left[\frac{y}{x}\right] + a = 0 \text{ સમીકરણમાં દર્શાવી શકાય.}$$

$$\frac{y}{x} = m \text{ લેતાં, } bm^2 + 2hm + a = 0 \dots (ii)$$

[B] <1> $\longrightarrow$ લંબરેખેલી વર્તુળો :

જે બે વર્તુળનાં છેદિયંતુઓમાં નીમન સ્પર્શક રેખાઓ વચ્ચેની ખૂણી કાટકીણ હોય બે વર્તુળો પરસ્પર લંબરેખેલી વર્તુળો કહેવાય છે.



$$\text{વર્તુળો } x^2 + y^2 + 2g_1x +$$

$$2f_1y + C_1 = 0$$

$$\text{અને } x^2 + y^2 + 2g_2x + 2f_2y + C_2 = 0$$

લંબરેખેલી હોય, નીમનું સ્પર્શક છેદિયંતુ

P હોય અને નીમનનાં કેન્દ્રો અનુક્રમે

A અને B હોય નો

$$PA = \sqrt{g_1^2 + f_1^2 - C_1},$$

$$PB = \sqrt{g_2^2 + f_2^2 - C_2}$$

અને $AB = \sqrt{(g_1 - g_2)^2 + (f_1 - f_2)^2}$ $\overrightarrow{PA}$ અને $\overrightarrow{PB}$ આ વર્તુળોના P આગળના સ્પર્શકો છે.

હવે કાટકીણ ΔAPB માં $\overrightarrow{PA} \perp \overrightarrow{PB}$

$$\therefore PA^2 + PB^2 = AB^2$$

$$\therefore g_1^2 + f_1^2 - C_1 + g_2^2 + f_2^2 - C_2 = (g_1 - g_2)^2 + (f_1 - f_2)^2$$

$$\therefore 2g_1g_2 + 2f_1f_2 = C_1 + C_2$$

આ બે વર્તુળો લંબરેખેલી હોવાનું સમાપ્ત્ય સાબત છે.

<2> $\longrightarrow$ $l_1: 4x - 8y + 10 = 0$

$$l_2: 2x - 4y + 5 = 0$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & -8 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = -16 + 16 = 0$$

$$\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -8 & 10 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} = -40 + 40 = 0$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 10 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 20 - 20 = 0.$$

∴ રેખાઓ સંપાત્રી છે.

∴ જોડાણ = $\{ (x, y) / 2x - 4y + 5 = 0, x, y \in \mathbb{R} \}$

(3) $\longrightarrow 2x + ky - 5 = 0, 4x - y - 3 = 0, kx - y - 2 = 0$
અસંપાત્ર રેખાઓ છે.

$$\begin{vmatrix} 2 & k & -5 \\ 4 & -1 & -3 \\ k & -1 & -2 \end{vmatrix} = 0.$$

$$\therefore 2(2-3) - k(-8+3k) - 5(-4+k) = 0.$$

$$\therefore -2 + 8k - 3k^2 + 20 - 5k = 0.$$

$$\therefore -3k^2 + 3k + 18 = 0$$

$$\therefore k^2 - k - 6 = 0 \quad \therefore (k-3)(k+2) = 0$$

$$\therefore k = 3 \text{ અથવા } k = -2$$

$k = 3$ માટે રેખાઓ $3x - y - 2 = 0$; $2x + 3y - 5 = 0$,
 $4x - y - 3 = 0$ થશે.

$$\text{અહીં } a_1b_2 - a_2b_1 = 3(3) - 2(-1) = 11 \neq 0$$

$$a_2b_3 - a_3b_2 = 2(-1) - 4(3) = -14 \neq 0.$$

$$a_3b_1 - a_1b_3 = 4(-1) - 3(-1) = -1 \neq 0$$

∴ $k = 3$ માટે રેખાઓ સંગામી છે, જોન જ રીતે.

$k = -2$ માટે પણ રેખાઓ સંગામી છે.

$$\therefore \boxed{k = 3, k = -2}$$

[C] (1) $\longrightarrow$ રેખા $y = mx$ એ વર્તુળ $x^2 + y^2 - 2ax = 0$

$$\text{ની છેદે, તો } x^2 + m^2x^2 - 2ax = 0$$

$$\therefore x[(1+m^2)x - 2a] = 0$$

$$\therefore x = 0 \text{ અથવા } x = \frac{2a}{1+m^2} \text{ મળે.}$$

∴ $y = mx$ પરથી x ને અનુક્રમે $y = 0$ અથવા

$$y = \frac{2am}{1+m^2} \text{ મળે.}$$


∴ $y = mx$ ની $x^2 + y^2 - 2ax = 0$ આપેલી

છેદાંકોમાં $O(0,0)$ અને $A\left(\frac{2a}{1+m^2}, \frac{2am}{1+m^2}\right)$ મળે.

હવે 0 થતી A વ્યાખ્યાન પિંડુઓવાળું વર્તુળ
 $(x-0)(x-\frac{2a}{1+m^2}) + (y-0)(y-\frac{2am}{1+m^2}) = 0$

$$\therefore x^2 + y^2 - \frac{2ax}{1+m^2} - \frac{2amy}{1+m^2} = 0$$

$\therefore (1+m^2)(x^2+y^2) - 2a(x+my) = 0$ જે
 માંગેલા વર્તુળનું સમીકરણ છે.



ધારી કે વર્તુળ $x^2 + y^2 = a^2$ ની સ્પર્શક

$$y = mx \pm a\sqrt{1+m^2} \text{ છે.}$$

જે વર્તુળની સ્પર્શક ના પિંડુ $P(x_1, y_1)$ માંથી
 પસાંદ થાય છે.

$$\therefore y_1 = mx_1 \pm a\sqrt{1+m^2}$$

$$\therefore (y_1 - mx_1)^2 = a^2(1+m^2)$$

$$\therefore y_1^2 - 2x_1y_1m + m^2x_1^2 = a^2 + a^2m^2$$

$$\therefore (a^2 - x_1^2)m^2 + 2x_1y_1m + (a^2 - y_1^2) = 0 \text{ મળે.}$$

જો આ સ્પર્શક સમીકરણ ના બીજાં m_1, m_2 હોય તો

$$m_1 m_2 = \frac{a^2 - y_1^2}{a^2 - x_1^2}$$

હવે P માંથી દોરેલા સ્પર્શકો લંબ છે.

$$\therefore m_1 m_2 = -1 \quad \therefore \frac{a^2 - y_1^2}{a^2 - x_1^2} = -1$$

$$\therefore a^2 - y_1^2 = x_1^2 - a^2$$

$$\therefore x_1^2 + y_1^2 = 2a^2$$

આ સમીકરણ વ્યાખ્યાન $x^2 + y^2 = 2a^2$

આમ P ની પિંડુ ગણ $x^2 + y^2 = 2a^2$ છે.

<2> $\longrightarrow$ વર્તુળ નું સમીકરણ $x^2 + y^2 = 25$ છે.

$oc^2 + y^2 = r^2$ સાથે સંબંધિતતા માં $r^2 = 25$

(x_1, y_1) બિંદુ આગળ ના સ્પર્શક નું

સમીકરણ $xx_1 + yy_1 = r^2$ છે.

$\therefore (3, 4)$ બિંદુ આગળ ના સ્પર્શક નું સમીકરણ $3x + 4y = 25$

તથા (x, y) બિંદુ આગળ ના સ્પર્શક નું સમીકરણ

$yx - x_1y = 0$ છે.

$\therefore (3, 4)$ બિંદુ આગળ ના સ્પર્શક નું સમીકરણ

$4x - 3y = 0$ છે.

[D] <1> $\longrightarrow$ રેખા $3x - 2y - 2 = 0$ પર નું બિંદુ $A(x_1, y_1)$ ધારી

$3x_1 - 2y_1 - 2 = 0 \therefore y_1 = \frac{3}{2}x_1 - 1$

બિંદુ A નું રેખા $3x + 4y - 8 = 0$ થી અંતર 8 સૂચિત

ધારી

$\therefore p = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ પ્રમાણે $8 = \frac{|3x_1 + 4(\frac{3}{2}x_1 - 1) - 8|}{\sqrt{9 + 16}}$

$\therefore |9x_1 - 12| = 15$

$\therefore |9x_1 - 12| = 15$

$\therefore 9x_1 - 12 = 15$ અથવા $9x_1 - 12 = -15$

$\therefore x_1 = 3$ અથવા $x_1 = -\frac{1}{3}$

પણ $y_1 = \frac{3}{2}x_1 - 1$ છે.


$x_1 = 3$ ની $y_1 = \frac{7}{2}$

$x_1 = -\frac{1}{3}$ ની $y_1 = -\frac{3}{2}$

$\therefore$ માંગેલ બિંદુ અથવા $(3, \frac{7}{2})$ અથવા $(-\frac{1}{3}, -\frac{3}{2})$ છે.

ઢાલણ

[D]



ઢાલણી $y = m_1x + c_1$ ઢાલણી $y = m_2x + c_2$ ની
 $x = 0$ ઢાલણી ની ઢાલણી $A(0, c_1)$, $B(0, c_2)$ ઢાલણી.
 $\therefore AB$ ઢાલણી y -ઢાલણી ઢાલણી.

ઢાલણી $m_2x - y + c_2 = 0$ ઢાલણી $m_1x - y + c_1 = 0$ ની
 ઢાલણી c ની x ઢાલણી :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -1 & c_2 \\ -1 & c_1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} m_2 & -1 \\ m_1 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-c_1 + c_2}{-m_2 - m_1} = \frac{c_2 - c_1}{m_1 - m_2}$$

ઢાલણી ઢાલણી, $P = c$ ની x ઢાલણી ની ઢાલણી

$$= \left| \frac{c_2 - c_1}{m_1 - m_2} \right| \text{ ઢાલણી}$$

$$AB^2 = (c_1 - c_2)^2 \quad \therefore AB = |c_1 - c_2|$$

$$\text{ઢાલણી } \Delta = \frac{1}{2} P \cdot AB$$

$$= \frac{1}{2} \left| \frac{c_2 - c_1}{m_1 - m_2} \right| \cdot |c_1 - c_2|$$

$$= \frac{1}{2} \frac{(c_1 - c_2)^2}{|m_1 - m_2|}$$

ઢાલણી ઢાલણી ઢાલણી ઢાલણી $= \frac{1}{2} \frac{(c_1 - c_2)^2}{|m_1 - m_2|}$ ઢાલણી ઢાલણી.

P.T.O.

Q:3 [A] <1> $\longrightarrow$ રેખા $y = mx + c$, પરવલય

$y^2 = 4ax$ નો સ્પર્શક બની તે માટેની

શરત તથા સ્પર્શબિંદુ ના યામ ($m \neq 0$)

પરવલય $y^2 = 4ax$ ના બિંદુ (x_1, y_1) આગળના સ્પર્શકનું સમીકરણ $yy_1 = 2a(x + x_1)$ છે --- (i)

જો રેખા $y = mx + c$ --- (ii) પરવલય નો (x_1, y_1) આગળનો સ્પર્શક હોય તો (i) અને (ii) એક જ રેખા દર્શાવી.

$$\therefore \frac{y_1}{1} = \frac{2a}{m} = \frac{2ax_1}{c}$$

$$\therefore y_1 = \frac{2a}{m} \text{ અને } x_1 = \frac{c}{m}$$

પણ બિંદુ (x_1, y_1) પરવલય પરનું બિંદુ છે.

$$\therefore y_1^2 = 4ax_1$$

$$\therefore \frac{4a^2}{m^2} = \frac{4ac}{m}$$

$\therefore c = \frac{a}{m}$, જો રેખા $y = mx + c$ સ્પર્શક બની તેની આવશ્યક અને પૂરતી શરત છે.

$$\text{અતઃ, સ્પર્શબિંદુ ના યામ} = (x_1, y_1) = \left[\frac{c}{m}, \frac{2a}{m} \right] =$$

$$\left[\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m} \right] \text{ થશે.}$$

<2> $\longrightarrow$ પરવલય $y^2 = 4ax$ પરનાં ભિન્ન બિંદુઓ

$P(t_1)$, $Q(t_2)$ અને $R(t_3)$ ના યામ અનુક્રમે

$(at_1^2, 2at_1)$, $(at_2^2, 2at_2)$ અને $(at_3^2, 2at_3)$ માં.

આ બિંદુઓ ભિન્ન અને અલગબેગ હોવાથી ΔPQR માં

એવી,

$$D = \begin{vmatrix} at_1^2 & 2at_1 & 1 \\ at_2^2 & 2at_2 & 1 \\ at_3^2 & 2at_3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 2a^2 \begin{vmatrix} t_1^2 & t_1 & 1 \\ t_2^2 & t_2 & 1 \\ t_3^2 & t_3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 2a^2 \begin{vmatrix} t_1^2 - t_2^2 & t_1 - t_2 & 0 \\ t_2^2 - t_3^2 & t_2 - t_3 & 0 \\ t_3^2 & t_3 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ R_2 \times (-1) \\ R_3 \times (-1) \end{matrix}$$

$$= 2a^2 (t_1 - t_2)(t_2 - t_3) \begin{vmatrix} t_1 + t_2 & 1 & 0 \\ t_2 + t_3 & 1 & 0 \\ t_3^2 & t_3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$R_1 \left(\frac{1}{t_1 - t_3} \right), R_2 \left(\frac{1}{t_2 - t_3} \right)$$

$$= 2a^2 (t_1 - t_2)(t_2 - t_3) [1(t_1 + t_2 - t_2 - t_3)]$$

$$= -2a^2 (t_1 - t_2)(t_2 - t_3)(t_3 - t_1)$$

હવે $\Delta = \frac{1}{2} |D|$ લેતાં, ΔPQR નું ક્ષેત્રફળ

$$= a^2 |(t_1 - t_2)(t_2 - t_3)(t_3 - t_1)| \text{ એકમ}$$

સુધારા

<2> $\longrightarrow$ રેખા $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$, ના આધારે
 $y^2 = 4ax$ ની સુધારે ને શરૂની રાશી લેવા.

રેખા $y = mx + c$ એ ના આધારે $y^2 = 4ax$.

ની સુધારે અને તેની સમાપ્તિ રાશી

$$c = \frac{a}{m}; m \neq 0 \text{ છે.}$$

$$\text{હવે, રેખા } x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$$

$$\therefore y \sin \alpha = -x \cos \alpha + p$$

$$\therefore y = -\cot \alpha \cdot x + p \cdot \operatorname{cosec} \alpha \text{ લેતાં,}$$

$$m = -\cot \alpha \text{ અને } c = p \cdot \operatorname{cosec} \alpha$$

$$\therefore \text{જરૂરી રાશી, } c = \frac{a}{m} \text{ પ્રમાણે}$$

$$p \cdot \operatorname{cosec} \alpha = \frac{a}{-\cot \alpha}$$

$$\therefore p \operatorname{cosec} \alpha + a \tan \alpha = 0$$

$$\therefore p + a \sin \alpha \tan \alpha = 0, \text{ જે માંગેલી શરત છે.}$$

$$[B] \langle 1 \rangle \longrightarrow SP = e PM = e \left| x - \frac{a}{e} \right|$$

કારણ કે $P(x, y)$ નું મિથામિકા $xc = \frac{a}{e}$ થી
હિસાબતર $\left| x - \frac{a}{e} \right|$ છે.

$$\therefore SP = |ex - a|$$

અમ, $x < a$ તથા $e < 1$ હોવાથી $ex < a$.

$$\therefore SP = a - ex$$

$$\text{તેજ રીતે } S'P = a + ex$$

$$\therefore SP + S'P = 2a.$$

$\langle 2 \rangle \longrightarrow$ દાશી કે ઉપલક્ષ્ય ના પિંડુ P આગળના

$$\text{આશરકે નું સમીકરણ } \frac{x}{a} \cos \theta + \frac{y}{b} \sin \theta - 1 = 0 \text{ છે}$$

તેનું નામિતિ $(ae, 0)$ થી લેવા અંતર P હોય તો

$$p = \frac{|axx_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{પ્રમાણે.}$$

$$p = \frac{|e \cos \theta - 1|}{\sqrt{\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2}}} \quad \therefore p^2 = \frac{a^2 b^2 (1 - e \cos \theta)^2}{b^2 a \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta} \quad \text{--- (i)}$$

$$\text{હવે, } SP = a(1 - e \cos \theta) \text{ અને } S'P = a(1 + e \cos \theta)$$

$$\therefore SP \cdot S'P = a^2 (1 - e^2 \cos^2 \theta)$$

$$= a^2 - a^2 e^2 \cos^2 \theta$$

$$= a^2 + (b^2 - a^2) \cos^2 \theta$$

$$= a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta \quad \text{--- (ii)}$$

આમ (i) અને (ii) પરથી

$$p^2 = \frac{b^2 SP^2}{SP \cdot S'P}$$

$$\therefore \frac{p^2}{p^2 + b^2} = \frac{SP}{2a}$$


$$\therefore \frac{p^2}{b^2} = \frac{SP}{S'P} \quad \therefore SP = \frac{2ap^2}{p^2 + b^2}$$

$$\therefore \frac{p^2}{p^2 + b^2} = \frac{SP}{SP + S'P}$$

બુદ્ધિવા

<2> —————> દાહી કે $P(a \cos \theta, b \sin \theta)$ ઉપલેખનું કીલ પિંડુ છે.

તથા $S(ae, 0)$ અને $S'(-ae, 0)$ નામિત્તુ છે.



1) આથી, $SP = a - ex = a - e \cdot a \cos \theta = a(1 - e \cos \theta)$
 અને $S'P = a + ex = a + e \cdot a \cos \theta = a(1 + e \cos \theta)$
 મળે છે.

($\therefore$ ગુણધર્મ (i))

$$\begin{aligned} \text{હવે, } SP \cdot S'P &= a^2 (1 - e^2 \cos^2 \theta) \\ &= a^2 - a^2 e^2 \cos^2 \theta \quad (\because b^2 = a^2(1 - e^2)) \\ &\Rightarrow b^2 - a^2 = -a^2 e^2 \end{aligned}$$

$$= a^2 (1 - \cos^2 \theta) + b^2 \cos^2 \theta = a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta$$

$$\text{આમ, } SP \cdot S'P = a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta$$

ii) આથી, PQ નામિત્તુ છે.

$\therefore$ તે ઉપલેખનું બાજુ પિંડુ છે.

$$\text{હવે, } SP + S'P = 2a \quad (\because \text{ગુણધર્મ (i)})$$

અને તે જ કારણે, $SQ + S'Q = 2a$ મળે છે.

હવે, $\Delta S'PQ$ ની પરિમિતિ = $S'P + PQ + S'Q$

$$\because P-S-Q \Rightarrow PQ = SP + SQ$$

$$= 2a + 2a$$

$$= 4a, \text{ જે અચળ છે.}$$

આમ, $\Delta S'PQ$ ની પરિમિતિ અચળ છે.

[૬] <1> → અનિવલય નાં બિંદુ (x, y) આગળના

અર્થક નું સમીકરણ :

$$\text{અનિવલય નું સમીકરણ } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ છે.}$$

$$\text{૦૦ પ્રત્યે વિકલન કરતાં } \frac{2x}{a^2} - \frac{2y}{b^2} \cdot \frac{dy}{dx} = 0.$$

$$\therefore \text{ જો } y \neq 0 \text{ તો } \frac{dy}{dx} = \frac{b^2 x}{a^2 y}$$

$$\therefore \left(\frac{dy}{dx} \right) (x_1, y_1) = \frac{b^2 x_1}{a^2 y_1} = \text{અર્થકની ઢાળ.}$$

$$\therefore \text{અર્થક નું સમીકરણ } y - y_1 = \frac{b^2 x_1}{a^2 y_1} (x - x_1)$$

$$\therefore b^2 x_1 x - a^2 y_1 y = b^2 x_1^2 - a^2 y_1^2$$

$$\therefore \frac{x_1 x}{a^2} - \frac{y_1 y}{b^2} = \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1$$

આમ, (x_1, y_1) આગળ ના અર્થક નું સમીકરણ

$$\frac{x_1 x}{a^2} - \frac{y_1 y}{b^2} = 1 \text{ છે.}$$

જો $y_1 = 0$ તો $x_1 = \pm a$ અને અર્થક નું સમીકરણ

$$x = \pm a \text{ મળે.}$$

<2> → અહીં દેખા $21x + 5y = 116$ છે.

$$\therefore 5y = -21x + 116$$

$$\therefore y = -\frac{21}{5}x + \frac{116}{5}$$

$$\text{અનિવલય } 7x^2 - 5y^2 = 232$$

$$\therefore \frac{x^2}{\frac{232}{7}} - \frac{y^2}{\frac{232}{5}} = 1$$

$$\therefore m = -\frac{21}{5} \quad c = \frac{116}{5} \quad a^2 = \frac{232}{7}, \quad b^2 = \frac{232}{5}$$

હવે $y = mx + c$ એ અનિવસ્ય ની સ્પર્શક થાય તેના કારણે $c^2 = a^2 m^2 - b^2$ સંતોષાશે.

$$\text{આથી } a^2 m^2 - b^2 = \frac{232}{7} \cdot \frac{441}{25} - \frac{232}{5}$$

$$= \frac{232}{25} \left[\frac{441}{7} - 5 \right]$$

$$= \frac{232}{25} [63 - 5]$$

$$= \frac{232}{25} \times 58$$

$$= \frac{116 \times 116}{25} = \left(\frac{116}{5} \right)^2 = c^2 \text{ જે છે જ}$$

આમ, $c^2 = a^2 m^2 - b^2$ કારણે સંતોષાય છે.

$$\therefore y = -\frac{21x}{5} + \frac{116}{5} \text{ એટલે કે } 21x + 5y = 116 \text{ એ.}$$

અનિવસ્ય $7x^2 - 5y^2 = 232$ ની સ્પર્શક છે.

[D] <1> $\longrightarrow$ આથી કોર્ષ $(\pm a, 0) = (\pm 4, 0)$ છે.

$$\therefore a = 4$$

તથા અર્ધન સ્પર્શક $y = \pm \frac{b}{a} x$ પ્રમાણે $y = \pm \frac{5}{4} x$

$$\therefore \frac{b}{a} = \frac{5}{4} \text{ અને } a = 4 \text{ છે.}$$

$$\therefore b = 5 \text{ મળે.}$$

હવે અનિવસ્ય ની સમીકરણ $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$\text{પ્રમાણે } \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{25} = 1$$

$$\text{એટલે કે } 25x^2 - 16y^2 = 400 \text{ મળે.}$$

$$\langle 2 \rangle \longrightarrow \text{વર્તુળ } x^2 + y^2 + 2gx + a^2 = 0 \text{ માટે } g = g,$$

$$f = 0, c = a^2$$

$\therefore$ નીચું કિન્દ્રા $(-g, 0)$ અને ત્રિજ્યા $\sqrt{g^2 - a^2}$ થશે

$$\text{અને વર્તુળ } x^2 + y^2 + 2fy + a^2 = 0 \text{ માટે } g = 0, f = f, c = a^2$$

$\therefore$ નીચું કિન્દ્રા $(0, -f)$ અને ત્રિજ્યા $\sqrt{f^2 - a^2}$ થશે.

હવે, બંને વર્તુલો બહાર થી સ્પર્શી છે. તેથી બંને વર્તુલોનાં કિન્દ્રા વચ્ચેનું અંતર તેમની ત્રિજ્યાઓનાં સરવાળા જેટલું થશે.

$$\therefore \sqrt{(-g-0)^2 + (0+f)^2} = \sqrt{g^2 - a^2} + \sqrt{f^2 - a^2}$$

$$\therefore g^2 + f^2 = g^2 - a^2 + f^2 + 2\sqrt{(g^2 - a^2)(f^2 - a^2)}$$

$$\therefore a^2 = \sqrt{(g^2 - a^2)(f^2 - a^2)}$$

$$\therefore a^4 = g^2 f^2 - g^2 a^2 - f^2 a^2 + a^4$$

$$\therefore f^2 a^2 + g^2 a^2 = g^2 f^2$$

$$\therefore \frac{1}{g^2} + \frac{1}{f^2} = \frac{1}{a^2} \quad (g^2 f^2 a^2 \text{ વડે ભાગતાં})$$

$$\therefore g^{-2} + f^{-2} = a^{-2}$$

$$\boxed{\text{Q:4}} [A] \longrightarrow 7x^2 - 2xy + 7y^2 + 12\sqrt{2}x - 36\sqrt{2}y + 72 = 0 \quad \dots (1)$$

અહીં x^2 ની સહગુણક = y^2 ની સહગુણક.

$\therefore$ સ્પર્શીનું $O = \frac{\pi}{4}$ જુદી પરિભ્રમણ કરતાં

(x, y) બદલાઈને (x', y') થાય છે.

$$\therefore x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$$

ઉપરોક્ત કિંમત પરિણામ (1) માં મૂકતાં

$$\begin{aligned} \therefore 7 \left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}} \right)^2 - 2 \left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}} \right) + 7 \left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}} \right)^2 \\ + 12\sqrt{2} \left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}} \right) - 36\sqrt{2} \left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}} \right) + 72 = 0 \end{aligned}$$

$$7 \left(\frac{x'^2 - 2x'y' + y'^2}{2} \right) - 2 \left(\frac{x'^2 - y'^2}{2} \right) + 7 \left(\frac{x'^2 + 2x'y' + y'^2}{2} \right)$$

$$+ \frac{12\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} (x' - y')}{2} - \frac{36\sqrt{2} \sqrt{2} (x' + y')}{2} + \frac{144}{2} = 0$$

$$\therefore 7x'^2 - 14x'y' + 7y'^2 - 2x'^2 + 2y'^2 + 7x'^2 + 14x'y' + 7y'^2 + 24x' - 24y' - 72x' - 72y' + 144 = 0$$

$$\therefore 12x'^2 + 16y'^2 - 48x' - 96y' + 144 = 0.$$

$$\therefore 6x'^2 + 8y'^2 - 24x' - 48y' + 72 = 0.$$

$$\therefore 6x'^2 - 24x' + 24 + 8y'^2 - 48y' + 72 = 24$$

$$\therefore 6(x' - 2)^2 + 8(y' - 3)^2 = 24$$

$$\therefore \frac{(x' - 2)^2}{4} + \frac{(y' - 3)^2}{3} = 1 \quad \text{--- (ii)}$$

હવે ઉગમ બિંદુ નું $(2, 3)$ બિંદુ એ સ્થાનાંતર કરતાં (x', y') બદલાઈને (x'', y'') થાય છે.

$$\therefore x'' = x' - 2 \quad y'' = y' - 3$$

ઉપરોક્ત ક્રમનુસાર પરિણામ (ii) માં મૂકતાં

$$\therefore \frac{x''^2}{4} + \frac{y''^2}{3} = 1 \text{ જે ઉપવલય દર્શાવે છે.}$$

અહીં $a^2 = 4$ $b^2 = 3$

$\therefore$ અક્ષોની લંબાઈ : પ્રધાન અક્ષની લંબાઈ =

$$\text{ગાંધી અક્ષની લંબાઈ} = 2a = 4$$

$$2b = 2\sqrt{3}$$

ઉત્કેન્દ્રતા માટે $b^2 = a^2(1 - e^2)$ માં $a^2 = 4$, $b^2 = 3$

$$\therefore 3 = 4(1 - e^2)$$

$$\therefore \frac{3}{4} = 1 - e^2$$

$$\therefore e^2 = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore e = \frac{1}{2}$$

$(0e'', y'')$ પદ્ધતિ માટે

જાણી $(0e, 0) = (1, 0)$

$(-0e, 0) = (-1, 0)$

કેન્દ્ર $(0e'', y'') = (0, 0)$

નિયામિકા $0e'' = +\frac{a}{e}$

$\therefore 0e'' = 4$

$0e'' = -\frac{a}{e} \therefore 0e'' = -4$

$(0e', y')$ પદ્ધતિ માટે

$0e' = 0e'' + 2 \quad y' = y'' + 3$

જાણી $(1+2, 0+3) = (3, 3)$

$(-1+2, 0+3) = (1, 3)$

કેન્દ્ર $(0+2, 0+3) = (2, 3)$

નિયામિકા $0e' = 4+2 \therefore 0e' = 6$

$0e' = -4+2 \therefore 0e' = -2$

$(0e, y)$ પદ્ધતિ માટે $x = \frac{0e' + y'}{\sqrt{2}} \quad y = \frac{0e' + y'}{\sqrt{2}}$

જાણી $\left(\frac{3-3}{\sqrt{2}}, \frac{3+3}{\sqrt{2}}\right) = (0, \frac{6}{\sqrt{2}}) = (0, 3\sqrt{2})$

$\left(\frac{1-3}{\sqrt{2}}, \frac{1+3}{\sqrt{2}}\right) = \left(\frac{-2}{\sqrt{2}}, \frac{4}{\sqrt{2}}\right) = (-\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$

કેન્દ્ર $\left(\frac{2-3}{\sqrt{2}}, \frac{2+3}{\sqrt{2}}\right) = \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}}\right)$

નિયામિકા $x' = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$

$\therefore 6 = \frac{x+y}{\sqrt{2}} \quad \text{નથા} \quad -2 = \frac{0e+y}{\sqrt{2}}$

$\therefore x+y = 6\sqrt{2} \quad \text{નથા} \quad x+y = -2\sqrt{2}$

અથવા

(i) $0e^2 - 8x + 8y + 11 = 0$,

$\therefore x^2 - 8xe + 16 + 8y - 5 = 0$

$\therefore (0e-4)^2 = -8(y - \frac{5}{8}) \quad \dots \dots \dots$ (ii)

અહીં ઉગમબિંદુ નું $(4, \frac{5}{8})$ બિંદુ હોઈ સ્થાનાંતર

કરતા $(0e, y)$ બદલાઈ $(0e', y')$ થાય છે.

$\therefore 0e-4 = 0e' \quad y - \frac{5}{8} = y'$

ઉપરોક્ત કિંમત પરિણામ (i) માં સૂકનાં

$$\therefore x'^2 = -8y' \text{ જે પથ્થલય દર્શાવે છે.}$$

(ii) $OC = 6$ ----- (i)

અહીં: અક્ષો નું $\theta = \frac{\pi}{4}$ ખૂણો પરિભ્રમણ કરનાં
 (x, y) બદલાઈ ને (x', y') થાય છે.


$$\therefore x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$$

ઉપરોક્ત કિંમત પરિણામ (i) માં સૂકનાં

$$\therefore \left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}} \right) = 6.$$

$$\therefore x'^2 - y'^2 = 12 \text{ જે હંબાતિવલય દર્શાવે છે.}$$

[B] (i)



દાશે કે A, B, C અને D
 સમતલના બિંદુ છે.
 તેમના કયાન અદિકો
 x_1, x_2, x_3 અને y_4
 છે.

દાશે કે $x_i = (x_i, y_i)$

જ્યાં $i = 1, 2, 3, 4$.

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff (x_2, y_2) - (x_1, y_1) = (x_4 - y_4) - (x_3, y_3)$$

$$\iff (x_2 - x_1, y_2 - y_1) = (x_4 - x_3, y_4 - y_3)$$

$$\iff x_2 - x_1 = x_4 - x_3, \quad y_2 - y_1 = y_4 - y_3$$

$$\begin{aligned} \text{હવે } AB &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ &= \sqrt{(x_4 - x_3)^2 + (y_4 - y_3)^2} \end{aligned}$$

$$\therefore AB = CD$$

મે ઊગમબિંદુ નું કયાનાંતર A બિંદુ થી કરીએ.
તો B ની કયાન સારિશ $\vec{r}_2 - \vec{r}_1$ થશે
અરિતે કે $\overrightarrow{AB}$ ના દિશા થી સારિશ $(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$ ના
દિશા થશે.

અથ ઘીતે ઊગમબિંદુ નું કયાનાંતર C બિંદુ થી કરનાં
D ની કયાન સારિશ $\vec{r}_4 - \vec{r}_3$ થશે. અરિતે કે
 $\overrightarrow{CD}$ ના દિશા થી સારિશ $\vec{r}_4 - \vec{r}_3$ ના દિશા થશે.
 $\therefore \overrightarrow{AB}$ ના દિશા = $\overrightarrow{CD}$ ના દિશા
 $\therefore$ બે સારિશ સમાન હીય તો નીમના ભાવ અર્થે
દિશા સમાન છે.

(iii) અહીં $\cos \alpha = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\cos \beta = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$

પરંતુ $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$

$\therefore \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cos^2 \gamma = 1$

$\therefore \cos^2 \gamma = \frac{1}{4}$

$\therefore \cos \gamma = \pm \frac{1}{2}$

$\therefore \gamma = \frac{\pi}{3} \quad \text{OR} \quad \gamma = \frac{2\pi}{3}$


[e] (i) $\Delta = \frac{1}{2} bc \sin A$

$= \frac{1}{2} |\vec{b}| |\vec{c}| \sqrt{1 - \cos^2 A}$


$= \frac{1}{2} |\vec{b}| |\vec{c}| \sqrt{1 - \left(\frac{\vec{b} \cdot \vec{c}}{|\vec{b}| |\vec{c}|} \right)^2}$

$= \frac{\frac{1}{2} |\vec{b}| |\vec{c}| \sqrt{|\vec{b}|^2 |\vec{c}|^2 - (\vec{b} \cdot \vec{c})^2}}{|\vec{b}| |\vec{c}|}$

$= \frac{1}{2} [|\vec{b}|^2 |\vec{c}|^2 - (\vec{b} \cdot \vec{c})^2]^{\frac{1}{2}}$



$$\begin{aligned}\text{નીચે કીલે } \Delta &= \frac{1}{2} [a^2 + b^2 - c^2] \\ &= \frac{1}{2} [a^2 + b^2 - c^2] \end{aligned}$$



ΔABC નું મધ્ય કેન્દ્ર G છે. તથા
 P એ ΔABC ના સમતલનું
 કોઈ બિંદુ છે.

ધારો કે P, A, B, C ના
 સ્થાન સદિશો અનુક્રમે

$\vec{O}, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$ છે.

$\therefore$ મધ્યકેન્દ્રની G સ્થાન સદિશ $\frac{\vec{x} + \vec{y} + \vec{z}}{3}$ થશે.

$$\begin{aligned}\text{હવે } \vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} &= (\vec{x} - \vec{O}) + (\vec{y} - \vec{O}) + (\vec{z} - \vec{O}) \\ &= \vec{x} + \vec{y} + \vec{z} \\ &= 3 \left(\frac{\vec{x} + \vec{y} + \vec{z}}{3} \right) \\ &= 3 \vec{PG}\end{aligned}$$

[D] <1> $\longrightarrow$

$3\hat{i} - \hat{j}$ ની દિશામાં એકમ સદિશ $\frac{1}{\sqrt{10}} (3\hat{i} - \hat{j})$

$\therefore 3\hat{i} - \hat{j}$ ની દિશામાં $2\sqrt{10}$ એકમનું બળ $\vec{F}_1 = \frac{2\sqrt{10}}{\sqrt{10}} (3\hat{i} - \hat{j})$

$2\hat{i} + 3\hat{j}$ ની દિશામાં એકમ સદિશ $= \frac{1}{\sqrt{13}} (2\hat{i} + 3\hat{j})$

$\therefore 2\hat{i} + 3\hat{j}$ ની દિશામાં $3\sqrt{13}$ એકમનું બળ $\vec{F}_2 = \frac{3\sqrt{13}}{\sqrt{13}} (2\hat{i} + 3\hat{j})$

$\therefore$ પરિણામી બળ $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 12\hat{i} + 7\hat{j} = (12, 7)$

અથવાનોર $\vec{AB} = (6, 4) - (1, 2) = (5, 2)$

$\therefore$ કાર્ય $= \vec{F} \cdot \vec{AB} = (12, 7) \cdot (5, 2) = 60 + 14 = 74$ એમ્

(બો.) $\vec{x} = \hat{i} + \hat{j} = (1, 1)$ $\vec{y} = t\hat{i} - \hat{j} = (t, -1)$

$\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\vec{x} \cdot \vec{y}}{|\vec{x}| |\vec{y}|}$ $\therefore -\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{t-1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{t^2+1}}$ $\therefore \sqrt{t^2+1} = t-1$

$\therefore t^2+1 = |t-1|^2$ $\therefore t^2+1 = t^2+1-2t$

$\therefore t = 0$

પ્રશ્ન: 5 (અ)

(1) દિશાંકિ A, B, C સમરેખ છે

$\therefore C(\vec{c})$ રેખા $\vec{a}$ ના સમીકરણ $\vec{r} - \vec{a} = k(\vec{b} - \vec{a})$ નું સમાધાન કરે છે કોઈક $k \in \mathbb{R}$ માટે

$$\vec{c} - \vec{a} = k(\vec{b} - \vec{a})$$

$$\therefore (k-1)\vec{a} + (-k)\vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$$

અહીં $k=0$ મૂકતાં $\vec{c} = \vec{a}$ અને $k=1$ મૂકતાં $\vec{b} = \vec{c}$

મને છે પણ A, B, C ભિન્ન છે. $k \neq 0, k \neq 1$

આમ $l = k-1, m = -k, n = 1$, ગાળીય શૂન્યતર
અને મને કે જેથી $l\vec{a} + m\vec{b} + n\vec{c} = \vec{0}$ અને $l+m+n=0$
દીશાની પથપિણા માટે દિશાંકિ શૂન્યતર l, m, n
એવા મને કે જેથી $l\vec{a} + m\vec{b} + n\vec{c} = \vec{0}$ અને $l+m+n=0$

અહીં $l = -m - n$ મૂકતાં

$$(-m-n)\vec{a} + m\vec{b} + n\vec{c} = \vec{0}$$

$$\therefore m(\vec{b} - \vec{a}) + n(\vec{c} - \vec{a}) = \vec{0}$$

$$\therefore \vec{c} - \vec{a} = -\frac{m}{n}(\vec{b} - \vec{a}) \quad \therefore n \neq 0$$

$$= k(\vec{b} - \vec{a}) \quad \text{જ્યાં } k = -\frac{m}{n}$$

જો $m \neq 0$ હોય તો $k \neq 0$, પણ $k=1$ તો $m+n=0$

$$\therefore l+m+n=0 \Rightarrow l=0 \quad \text{કે પક્ષથી ચિપચિપ છે}$$

આમ $k \neq 0, k \neq 1$

$\therefore C(\vec{c})$ રેખા $\vec{r} - \vec{a} = k(\vec{b} - \vec{a})$ પર જોઈએ તો $\vec{a}$ પર છે

$\therefore C$ એ A અને B થી C થી ભિન્ન. એવું બિંદુ છે અને
 A, B, C સમરેખ છે

(2) દિશાંકિ $\vec{r} = \vec{a} + k\vec{l}, k \in \mathbb{R}$ અને

$$\vec{r} = \vec{b} + k'\vec{l}, k' \in \mathbb{R} \quad \text{સમાંતર રેખાઓ છે}$$

અને $\vec{a} \neq \vec{b} = \vec{b} + k'\vec{l}, k' \in \mathbb{R}$

અહીં $A(\vec{a})$ અને $B(\vec{b})$ રેખા, તો $\vec{b} - \vec{a}$ અને $\vec{l}$

અસમરેખ થશે. $\therefore \vec{b} - \vec{a} = (\vec{b} - \vec{a}) \times \vec{l} \neq \vec{0}$

જો $A(\vec{a})$ માંથી પસાર થતા અને $\vec{b}$ અભિલંબવાળા
સમતલનું સમીકરણ $(\vec{r} - \vec{a}) \cdot \vec{n} = 0$ છે.

અહીં $\vec{n} = (\vec{b} - \vec{a}) \times \vec{l}$ લઈએ તો આપણી જાંને

સાબિત કરીએ

$$\therefore \vec{r} - \vec{b} = k\vec{l} \text{ જુદાં } (\vec{r} - \vec{b}) \cdot \vec{n} = k\vec{l} \cdot [(\vec{b} - \vec{b}) \times \vec{l}] = 0$$

$$\text{અને } \vec{r} = \vec{b} + k\vec{l} \text{ જુદાં}$$

$$\begin{aligned} (\vec{r} - \vec{b}) \cdot \vec{n} &= (\vec{b} - \vec{b} + k\vec{l}) \cdot [(\vec{b} - \vec{b}) \times \vec{l}] \\ &= (\vec{b} - \vec{b}) \cdot [(\vec{b} - \vec{b}) \times \vec{l}] + k\vec{l} \cdot [(\vec{b} - \vec{b}) \times \vec{l}] \\ &= 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

આમ માગેલું સાબિત $(\vec{r} - \vec{b}) \cdot [(\vec{b} - \vec{b}) \times \vec{l}] = 0$ છે.

કાર્તેઝીય સ્વરૂપમાં સાબિતનું સમીકરણ

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ l_1 & l_2 & l_3 \end{vmatrix} = 0 \text{ મળશે.}$$

$$\text{જ્યાં } \vec{l} = (l_1, l_2, l_3)$$

$$\vec{b} = (x_1, y_1, z_1) \quad \vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$$

પ્રશ્ન: 5 (b)

$$(1) \text{ આપેલું સમીકરણ } x^2 + y^2 + z^2 + 2px + 2qy + 2wz + d = 0$$

$$\therefore x^2 + 2px + p^2 + y^2 + 2qy + q^2 + z^2 + 2wz + w^2 = p^2 + q^2 + w^2 - d$$

$$\therefore (x+p)^2 + (y+q)^2 + (z+w)^2 = p^2 + q^2 + w^2 - d$$

સમીકરણને $(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 + (z-\gamma)^2 = r^2$ સાથે
દરબાબતે $\alpha = -p, \beta = -q, \gamma = -w$ અને

$$r^2 = p^2 + q^2 + w^2 - d > 0 \text{ મળે, એ ગોલકની ત્રિજ્યા}$$

$r^2 > 0$ હોવાથી $p^2 + q^2 + w^2 - d > 0$ હોયું જોઈએ.
આમ આપેલું સમીકરણ ગોલક દર્શાવે તેમાટેની

$$\text{આવશ્યક શરત } p^2 + q^2 + w^2 - d > 0 \text{ છે.}$$

જો $p^2 + q^2 + w^2 - d > 0$ ના કિસ્સે $(-p, -q, -w)$

અને ત્રિજ્યા $\sqrt{p^2 + q^2 + w^2 - d}$ થાય.

(૨) આપેલી રેખાઓની સદિશ સમીકરણો લખતાં

$$\vec{r} = (3, -15, 9) + k(2, -7, 5) \quad k \in \mathbb{R}$$

$$\vec{r} = (-1, 1, 9) + k(2, 1, -3) \quad k \in \mathbb{R}$$

$$\therefore \vec{a} = (3, -15, 9), \vec{b} = (-1, 1, 9), \vec{l} = (2, -7, 5)$$

$$\vec{m} = (2, 1, -3)$$

$$\therefore \vec{l} \times \vec{m} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -7 & 5 \\ 2 & 1 & -3 \end{vmatrix} = (16, 16, 16)$$

$$\therefore |\vec{l} \times \vec{m}| = \sqrt{16^2 + 16^2 + 16^2} = 16\sqrt{3}$$

$$\therefore \text{એ } \vec{u} = \frac{\vec{l} \times \vec{m}}{|\vec{l} \times \vec{m}|} = \frac{(16, 16, 16)}{16\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1)$$

$$\vec{b} - \vec{a} = (-1, 1, 9) - (3, -15, 9) = (-4, 16, 0)$$

$$\therefore \text{બે રેખાઓ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર } |(\vec{b} - \vec{a}) \cdot \vec{u}|$$

$$= |(-4, 16, 0) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1)| = \frac{1}{\sqrt{3}} |-4 + 16 + 0| = 4\sqrt{3}$$

અથવા

(૨) આપેલી રેખાઓની સદિશ સમીકરણો

$$\vec{r} = (1, -2, 3) + k(1, 1, 1), \quad k \in \mathbb{R} \text{ અને}$$

$$\vec{r} = (2, -3, 5) + k(1, 1, 1) \quad k \in \mathbb{R} \text{ મળે}$$

$$\text{તેથી } \vec{a} = (1, -2, 3), \vec{l} = (1, 1, 1) \quad \vec{b} = (2, -3, 5)$$

$$\vec{m} = (1, 1, 1)$$

$$\therefore \vec{AB} = \vec{b} - \vec{a} = (2, -3, 5) - (1, -2, 3) = (1, -1, 2)$$

$$\vec{l} = \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1)$$

$$\therefore \vec{AB} \times \vec{l} = (1, -1, 2) \times \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} (-3, 1, 2)$$

$\therefore$ બંને સમાંતર રેખાઓ વચ્ચેનું લંબ અંતર

$$= |\vec{AB} \times \vec{l}| = \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{9 + 1 + 4} = \frac{\sqrt{14}}{3}$$

પ્રશ્ન: 5 (C)

$$(1) V(1, 1, 3) \quad A(4, 3, 2) \quad B(5, 2, 7)$$

$$C(6, 4, 8)$$

$$\therefore \vec{VA} = (3, 2, -1) \quad \vec{VB} = (4, 1, 4) \quad \vec{VC} = (5, 3, 5)$$

$$\therefore [\vec{VA}, \vec{VB}, \vec{VC}] = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 4 & 1 & 4 \\ 5 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= 3(-7) - 2(0) - 1(7)$$

$$= -28$$

$$\therefore \text{આગેલું ઘનફળ} = \frac{1}{6} |-28| = \frac{28}{6} = \frac{14}{3} \text{ એકમ.}$$

$$(2) (2, -1, 2) = \vec{v}$$

$$\text{અન્ય તલનું સમીકરણ } (x, y, z) \cdot (2, -3, 4) = 44$$

$$\therefore \vec{n} = (2, -3, 4), d = 44.$$

A માંથી અન્ય તલ પરના લંબચાદ M નો સ્થાન

$$\text{અદિશ } \vec{m} = \vec{v} + K_1 \vec{n} \quad \text{જ્યાં } K_1 = \frac{d - \vec{v} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|^2}$$

$$\text{હાે } K_1 = \frac{44 - (2, -1, 2) \cdot (2, -3, 4)}{4 + 9 + 16}$$

$$= \frac{44 - (4 + 3 + 8)}{29} = \frac{44 - 15}{29} = 1$$

$$\therefore \vec{m} = \vec{v} + K_1 \vec{n}$$

$$= (2, -1, 2) + 1(2, -3, 4) = (4, -4, 6)$$

અહીં A માંથી બસાર થતી લંબ રેખા L ની દિશા

$$\vec{AM} = (4, -4, 6) - (2, -1, 2) = (2, -3, 4)$$

$$\therefore AM = |\vec{AM}| = |(2, -3, 4)| = \sqrt{4 + 9 + 16} = \sqrt{29}$$

$$\therefore \text{આગેલી લંબ રેખા } \vec{r} = (2, -1, 2) + K(2, -3, 4) \quad K \in \mathbb{R}$$

(5) દિશાકે માગેલા ગાલિકનું સમીકરણ

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0 \quad \text{--- (1) છે}$$

આ ગાલિક A (1, 0, -1), B (-1, 1, 0), C (0, -1, 1)

માંથી પસાર થાય છે

$$\therefore 1 + 0 + 1 + 2u - 2w + d = 0$$

$$\therefore 2u - 2w + d + 2 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$\therefore -2u + 2u + d + 2 = 0 \quad \text{--- (3)}$$

$$\therefore -2u + 2w + d + 2 = 0 \quad \text{--- (4)}$$

$$(2) + (3) + (4) \Rightarrow 3d + 6 = 0 \Rightarrow d = -2$$

$$\therefore (2), (3), (4) \Rightarrow u = v = w \quad \text{--- (5)}$$

સમતલ ABCનું સમીકરણ

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-0 & z+1 \\ -1-1 & 1-0 & 0+1 \\ 0-1 & -1-0 & 1+1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore \begin{vmatrix} x-1 & y & z+1 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore (x-1)(3) - y(-3) + (z+1)(3) = 0$$

$$\therefore x-1 + y + z+1 = 0$$

$$\therefore x + y + z = 0$$

ગાલિકનું કેન્દ્ર (-u, -v, -w) આ સમતલ પર આવેલું છે.

$$\therefore -u - v - w = 0 \quad \therefore u + v + w = 0 \quad \text{--- (6)}$$

$$(5) (6) \Rightarrow u = v = w = 0$$

$$\therefore \text{ગાલિકનું સમીકરણ } x^2 + y^2 + z^2 = 2$$

જવાબ

પ્રશ્ન-5 (ડ) આપેલ બિંદુઓ $a = (1, 2, 3)$ અને

$b = (3, -1, 2)$ માંથી પસાર થાય છે. અને
સમતલ $x + 3y + 2z = 7$ ને લંબ છે.

$$\therefore (x, y, z) \cdot (1, 3, 2) = 7 \text{ થાય.}$$

આપેલ સમતલનો અભિલંબ $\vec{n} = (1, 3, 2)$.

$$\text{હવે } \vec{AB} = \vec{b} - \vec{a} = (3, -1, 2) - (1, 2, 3) = (2, -3, -1)$$

$$\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= -3\vec{i} - 5\vec{j} + 9\vec{k}$$

$$= (-3, -5, 9)$$

બિંદુઓ સમતલ પર સ્થિત હોય તો $\vec{r} \cdot \vec{n} = \vec{a} \cdot \vec{n}$.

$$\therefore (x, y, z) \cdot (-3, -5, 9) = (1, 2, 3) \cdot (-3, -5, 9)$$

$$\therefore -3x - 5y + 9z = -3 - 10 + 27$$

$$\therefore 3x + 5y - 9z + 14 = 0$$

જે બિંદુઓ સમતલ પર છે.